


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 34 din 04.09.2025

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare:***Athalia rosae - Viespea rapiței***

Insecta are 2-3 generații pe an. Iernează ca larvă într-un cocon în sol (la adâncime de 5 - 15 cm). Apariția adulților are loc în primăvară. Viespiile sunt mici (5 - 9 mm) și pot fi recunoscute ușor datorită culorii portocalii strălucitoare a corpului. După împerechere, femela depune ouăle pe marginea frunzelor de diferite specii din familia crucifere(rapiță, muștar, varză, etc). Larvele sunt de culoare închisă sau verde-cenușie, de 18 - 25 mm. Ele sunt miniere la început, apoi rod frunzele până la scheletare și trec pe inflorescențe și fructe verzi. În urma atacului puternic plantele se usucă. La completa dezvoltare larvele se retrag în sol. Noii adulți apar în timpul verii, dar în majoritatea cazurilor, când verile sunt secetoase, larvele primei generații rămân în coconi, până în toamnă, când are loc transformarea în adulți care formează generația de toamnă, prezența adulților fiind semnalată până în luna octombrie. Cele mai mari pagube la culturile de rapiță le produc larvele din generația de toamnă (larvele gen. II), iar la muștar cele din generația de primăvară (larvele din gen I). Răsărirea neuniformă și densitatea necorespunzătoare influențează atacul. În condiții de secetă și temperaturi ridicate larvele sunt foarte vorace. La densități mari pot distruge o cultură în câteva zile. De aceea este necesară monitorizarea zilnică a culturilor, pe diagonala solei, mai ales în primele faze de vegetație, pentru depistarea larvelor. Observațiile se fac cu multă atenție, deoarece larvele sunt mici și stau pe fața inferioară a frunzelor. De asemenea poate fi monitorizat zborul adulților, prin observarea directă a viespiilor sau cu capcane galbene cu lipici. Când zborul este intens se verifică și prezența larvelor pe frunze. Unii cercetători recomandă tratament chimic când se constată zbor masiv al adulților în culturile de rapiță în curs de răsărire pentru ca femelele să nu apuce să depună ouăle. Pentru a preveni atacul dăunătorului sunt necesare următoarele măsuri profilactice: amplasarea noilor culturi de rapiță cât mai departe de cele vechi, arături după recoltarea cruciferelor pentru a aduce larvele din sol la suprafață și a le expune factorilor de mediu, distrugerea buruienilor din familia crucifere care pot fi gazde intermediare, fertilizarea echilibrată care să ofere plantelor un start bun la începutul perioadei de vegetație, tratamentul semințelor.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la culturile de rapiță de toamnă, la apariția larvelor din gen. II , cu unul din produsele:

1. Inazuma = 0,125 - 0,2 kg/ha

2. Mavrik 2F(Evure - a doua denumire comercială) = 0,2 L/ha

sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Atenție: În perioada toamnei mai pot produce pagube în culturile de rapiță puricii cruciferelor, afidele, fluturele verzei, buha semănăturilor (larvele generației II).

Alte recomandări:

Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe eticheta produsului.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena ULEA



ALTE RECOMANDARI

- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu : Legea apiculturii 383 /2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; precum și cu Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din Romania - Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu PPP.
- La realizarea amestecurilor se va verifica, cu mare atenție, compatibilitatea produselor utilizate.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
 - Registru de evidență a tratamentelor, se completează la zi în format letric sau electronic și se păstrează pentru o perioadă de cel puțin trei ani evidența produselor fitosanitare pe care le utilizează la nivelul fermei.
- Respectați prevederile Ord.nr. 297/2017 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. (www.anfdf.ro).
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare .
- Respectați măsurile obligatorii privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în adresa de informare nr. 116 din 04.02.2025 a Oficiului Fitosanitar Iasi.
- Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS <https://fits.anfdf.ro>
- Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sunt obligați sa efectueze inspectia tehnica periodica a acestor echipamente.
- Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați. Eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare. Etc

Coordonator

Ing. Bisog Corneliu-Adrian

